

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY (biopsie štítné žlázy)

POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:

Název poskytovatele	Centrum zdravotní péče Jirny
Adresa poskytovatele	Tovární 19, 250 90 Jirny
Odbornost poskytovatele	Endokrinologie
Lékař	MUDr. Andrea Zápotocká

PACIENT (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI):

Příjmení, jméno, titul	
Rodné číslo	
Adresa bydliště	
Zákonný zástupce – 1	
Zákonný zástupce – 2	

INFORMACE O ZDRAVOTNÍ SLUŽBĚ

Účelem aspirační biopsie štítné žlázy tenkou jehlou a následného cytologického vyšetření (zhodnocení buněk pod mikroskopem) odebraného materiálu je zjistit povahu útvarů, které byly ve štítné žláze nalezeny (uzly, cysty). Tento výkon současně může v některých případech sloužit k vyprázdnění případného tekutého obsahu. Jiná srovnatelně výtěžná vyšetřovací metoda k tomuto vyšetření není v současné době známa (ultrazvukové vyšetření není dostačující).

Výkon je prováděn lékařem. Lékař nejprve ověří umístění příslušného ložiska ve štítné žláze ultrazvukovým přístrojem a následně za pomoci tenké jehly, která je přes kůži zavedena do ložiska ve štítné žláze, odebere malý vzorek materiálu. Výsledek cytologického vyšetření je k dispozici do 2 týdnů od data provedení výkonu.

Týden před plánovaným výkonem pacient nesmí používat léčivé přípravky obsahující: clopidogrel (Plavix, Trombex, Zylit, atd.), ticlopidin (Apo-Tic, Tygrem, Ipaton, atd.), dipyridamol (Aggrenox, atd.), kyselinu aceytylsalicylou (Anopyrin, Acylpyrin, Godasal, Alnagon, Aspirin, Tomapyrin, Upsarin, atd.), ibuprofen (Brufen, Ibalgin). V případě užívání léčivých přípravků zvyšujících krvácivost (Warfarin, atd.) je povinností pacienta o této skutečnosti informovat lékaře před zahájením plánovaného výkonu.

Po provedení aspirační biopsie štítné žlázy není nutná pracovní neschopnost. Doporučuje se v následujících 12 hodinách nezvedat těžké předměty a neprovádět fyzicky extrémně náročnou práci.

INFORMACE O MOŽNÝCH KOMPLIKACÍCH

Komplikace při výkonu nejsou časté. Z důvodu nutného záklonu hlavy s možným podrážděním nervových struktur mohou nastat závratě, někdy doprovázené přechodným snížením srdeční frekvence. Krvácení je většinou ohraničené, může se projevit případným zvětšením uzlu nebo bolestivostí. Ustoupí samovolně, rychleji po přiložení chladného obkladu.

Velmi vzácně může nastat krvácení mimo štítnou žlázu, které vede ke vzniku modřiny. Při rozsáhlém krvácí může dojít k útlaku dýchacích cest s dušením nebo přechodné obrně hlasivkového nervu, projevující se chrapotem.

SOUHLAS PACIENTA

Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně informován(a) a poučen o výkonu aspirační biopsie štítné žlázy včetně upozornění na možné komplikace. Při poučení jsem měl možnost klást dotazy. Veškeré mé dotazy mi byly zodpovězeny. Poučení jsem porozuměl(a) a na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením výkonu aspirační biopsie štítné žlázy.

datum

podpis pacienta

Zákonní zástupci u nezletilého pacienta:

podpis zákonného zástupce – 1

podpis zákonného zástupce - 2