

# SOUHLAS S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

## Sigmoideoskopie

### POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:


Název poskytovatele	Centrum zdravotní péče Jirny (provozovatel: INC, a.s.)
Adresa poskytovatele	Tovární 19, 250 90 Jirny
Odbornost poskytovatele	105 Gastroenterologie
Lékař	

### PACIENT (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI):

Příjmení, jméno, titul	
Rodné číslo	
Adresa bydliště	

### POPIS ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:

Sigmoideoskopie je vyšetření tlustého střeva kolonoskopem. Na základě Vašich potíží nebo jako preventivní opatření k časnému rozpoznání možných chorobných změn v levé polovině tlustého střeva se u Vás doporučuje endoskopie jen levé části tlustého střeva. Kolonoskop (optický ohebný přístroj) se zasune konečníkem až do oblasti slezinného ohbí. Během vyšetření je k průchodu přístroje a dobré přehlednosti nutné do střeva dle situace a potřeby provádějícího lékaře vpravovat určité množství vzduchu nebo vody. Přímou hodnotíme stav střeva, můžeme odebrat malé vzorky k upřesnění diagnózy a dle potřeby snášet (odstranit) i polypy.



## INFORMACE O ZDRAVOTNÍ SLUŽBĚ

### Příprava před výkonem:

Aby bylo vyšetření provedeno důkladně, střevo musí být očištěno od stolice, proto dbejte doporučení o přípravě sigmoideoskopii, které obdržíte při objednání výkonu.

### Popis výkonu:

Před začátkem výkonu Vám bude po domluvě s lékařem podána premedikace, léky na zklidnění a uvolnění střeva, do žilního systému. V poloze na levém boku Vám lékař zavede přístroj do konečníku a dále do tlustého střeva. Rozsah vyšetření je dán indikací a kvalitou přípravy. Během výkonu můžete mít nepříjemné pocity v oblasti břicha způsobené zaváděním přístroje a vpravováním vzduchu nebo vody do střeva.

### Po výkonu:

Po aplikaci injekce by pacient neměl 24 hodin řídit dopravní prostředek. Po některých typech výkonu je možné pacienta hospitalizovat. Výkon se většinou provádí ambulantně, s možností odpočinout si na dospávacím pokoji. Je vhodné zajistit doprovod pacienta po vyšetření. Individuálně upravuje postup po výkonu lékař.

## INFORMACE O MOŽNÝCH KOMPLIKACÍCH

### Rizika vyšetření:

Sigmoideoskopie může vést k některým komplikacím, např. k alergické reakci na podaný lék. V případě léčebných zákroků může dojít k perforaci střeva či krvácení. Tyto komplikace jsou zcela výjimečné, ale mohou vyžadovat akutní léčbu nebo dokonce operaci. Odběr vzorku tkáně a endoskopické odstranění polypů může vést k malému krvácení.

Ke snížení rizika většího krvácení nebo alergické reakce, případně jiné komplikace, zodpovězte prosím následující otázky (\* *nehodící se škrtněte*):

1. Vyskytuje se u Vás či u člena Vaší rodiny zvýšený sklon ke krvácení již při malých poraněních? ANO-NE
2. Užíváte nějaké léky na ředění krve (Anopyrin, Acylpyrin, Warfarin, Godasal, Stacyl, Trombex, Xarelto, Pradaxa). Pokud ano tak jaké? ANO-NE
3. Trpíte nějakou alergií? Pokud ano, napište jakou? ANO-NE
4. Máte kardiostimulátor, potíže se srdcem nebo astma? ANO-NE
5. Máte zelený zákal – glaukom? ANO-NE
6. Máte nějaké jiné závažné onemocnění? Pokud ano, jaké? ANO-NE
7. Pro ženy - Jste právě těhotná? ANO-NE

**V případě komplikací po kolonoskopii či polypektomii (např. krutá bolest v břiše, krvácení z konečníku) kontaktujte nejbližší chirurgické oddělení:**

## S O U H L A S   P A C I E N T A

Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně informován(a) a poučen(a) o průběhu Kolonoskopie včetně upozornění na možné komplikace. Při poučení jsem měl(a) možnost klást dotazy. Veškeré mé dotazy mi byly zodpovězeny. Poučení jsem porozuměl(a) a na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením tohoto vyšetření - sigmoideoskopií, odběrem vzorků a s případným léčebným zákrokem

-----  
datum

-----  
podpis pacienta

Při nejasnostech ohledně přípravy na vyšetření a vlastního vyšetření se informujte na endoskopickém pracovišti na tel. 228 805 825. Pokud se nemůžete dostavit k vyšetření, informujte nás co nejdříve, abychom mohli objednat jiného pacienta.