

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY (estetické, funkční, plastické urologické výkony)

POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:

| | |
|-------------------------|--|
| Název poskytovatele | Centrum zdravotní péče Jirny (provozovatel: INC, a.s.) |
| Adresa poskytovatele | Tovární 19, 250 90 Jirny |
| Odbornost poskytovatele | |
| Lékař | |

PACIENT (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI):

| | |
|------------------------|--|
| Příjmení, jméno, titul | |
| Rodné číslo | |
| Adresa bydliště | |
| Zákonný zástupce – 1 | |
| Zákonný zástupce – 2 | |

POPIS ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:

| |
|--|
| |
|--|

INFORMACE O ZDRAVOTNÍ SLUŽBĚ

Účelem mužské obřízky (upravení funkčnosti předkožky) nebo frenuloplastiky (funkční a estetické upravení krátké uzdičky penisu) je zajistit dostatečné přetažení předkožky za účelem správného močení, hygieny, prevence zánětů, prevence poruch erekce a prevence nádorů penisu. Příčinou zúžení předkožky a nemožnosti jejího přetažení může být úraz, zánět nebo vrozené zúžení.

Výkon se provádí zpravidla v lokální anestezii. Lékař k anestezii použije 1% Mesocain nebo 0,5 % Marcain injekčně nebo znečitlivující krém zvláště při výkonech u dětí. Lokální znečitlivění je vyřazení pocitu bolesti v místě prováděného výkonu, které ale téměř neovlivňuje životní funkce – vědomí, krevní oběh, dýchání a umožňuje kontakt s nemocným a jeho spolupráci. Použití uvedených technik je vhodné i k provádění malých chirurgických výkonů u nemocných, kteří mají závažná onemocnění, jako jsou například choroby krevního oběhu, dýchacího systému, cukrovku atd. Před zahájením vlastního zákroku se místo očistí a dezinfikuje. Výkon se provádí na chirurgickém sálku, aby byly dodrženy zásady aseptického (sterilního) postupu.

Lékař odstraní zúžení na předkožce nebo odstraní zkrácení uzdičky a dle konkrétní situace ránu sešije stehy ze vstřebatelného materiálu. Po výkonu je nutné dodržovat několik zásad pro rychlejší hojení, omezení rozsahu otoků a hematomů. Mezi tyto zásady patří chlazení operované oblasti gelovými vaky a klidový režim po dobu minimálně 2, lépe až 4 dnů. Lze dále užívat enzymatické preparáty pro rychlejší a snadnější zhojení rány, vstřebání případných hematomů atd., ale je nutno se vždy poradit s operátorem o jejich vhodnosti a to již před výkonem. Do úplného zhojení ran a vypadání stehů není vhodné z důvodu

rizika infekce se koupat ale pouze sprchovat. Rány jsou zhojeny zpravidla za 2-3 týdny, po tuto dobu je nutné dodržovat úplnou sexuální abstinenci.

INFORMACE O MOŽNÝCH KOMPLIKACÍCH

Při podání lokálního anestetika může u pacienta dojít k alergické reakci. Pacient může mít pocit nespecifické závratě nebo malátnosti, u vegetativně labilních pacientů může dojít až ke kolapsu.

I přes veškerou péči lékaře může při vlastním malém operačním výkonu dojít k částečným komplikacím. V oblasti ran se mohou objevit krevní nebo serosní výrony, které se postupně samovolně nebo s instrumentací vstřebají. Zřídka dojde k poškození (zúžení zevního ústí) močové trubice. Všeobecné komplikace doprovázející malé chirurgické výkony jako trombóza (vytváření se krevních sraženin v žilách, např. dolních končetin), embolie (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během výkonu, infekce v operačním poli, jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké.

SOUHLAS PACIENTA

Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně informován(a) a poučen o malém chirurgickém výkonu včetně upozornění na možné komplikace. Při poučení jsem měl možnost klást dotazy. Veškeré mé dotazy mi byly zodpovězeny. Poučení jsem porozuměl(a) a na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením malého gynekologicko chirurgického výkonu.

datum

podpis pacienta

Zákonní zástupci u nezletilého pacienta:

podpis zákonného zástupce – 1

podpis zákonného zástupce - 2